

## がん薬物療法計画指示書（肺癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 CDDP + VP-16 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 年 月 日 ~ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目 / 4クール

2. 患者情報 診断名 ( 進行・再発小細胞肺癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Ccr \_\_\_\_\_ mL/min

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①エトポシド 100mg	100 mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 500mL
②シスプラチン(10mg : 25mg : 50mg)	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 500mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day1 ( / )	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.			
	15min	生食 50mL + パロノセトロン 0.75mg + デキサート 9.9mg div.			
	1hr	生食 500mL + エトポシド _____ mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL + 硫酸マグネシウム補正液 8mL div.			
	1hr	生食 500mL + シスプラチン _____ mg div. (遮光保存) (全量 500mL に調製する)			
	全開で	生食 50mL + フロセミド注 20mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL div.			
Day2 ( / )	30min	生食 100mL + デキサート 6.6mg div.			
	1hr	生食 500mL + エトポシド _____ mg div.			
Day3 ( / )	30min	生食 100mL + デキサート 6.6mg div.			
	1hr	生食 500mL + エトポシド _____ mg div.			
Day4 ( / )	30min	生食 100mL + デキサート 6.6mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					

(注意) エトポシドを投与する場合、可塑剤 (DEHP) を含まない PVC フリーの点滴セットを使用して下さい。

5. 投与時の注意点 (適応患者)

(ア) 腎機能・心機能が十分に維持されていること。また全身状態が良好であること。(PS 0~1)

(イ) 当日シスプラチン投与が終了するまでに、1L 程度の飲水を心掛けるよう患者に促す。また翌日以降も腎障害を予防するため十分な飲水 (通常の飲食に加え 1L 程度の飲水) を摂るよう指導する。(約 3~5 日間)