

がん薬物療法計画指示書（肺癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 テセントリク + BV + CBDCA + PTX 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 _____ 年 月 日 ~ _____ 年 月 日

・実施クール () クール目 / 4~6クール

なお、テセントリク併用療法終了後、テセントリク+BV療法を継続して下さい。

2. 患者情報 診断名（化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌）

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²

年齢 _____ 歳 sCr _____ mg/dL GFR _____

※アルコール過敏症の患者は慎重投与

3. 使用薬剤・投与量

CBDCA 投与量 () mg/body = AUC × (GFR+25) ; GFR = $\frac{(140 - \text{Age}) \times \text{体重}}{\text{sCr}(\text{mg/dL}) \times 72}$

女性の場合は体重に 0.85 を掛ける

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①テセントリク 1200mg	1200mg/body	1200mg (固定用量)	d. i. v.	生食 250mL
②アバスチン (100mg : 400mg)	15mg/kg	mg	d. i. v.	生食 100mL
③パクリタキセル (30mg : 100mg)	200 mg/m ²	mg	d. i. v.	生食 500mL
④カルボプラチン (50mg : 150mg : 450mg)	AUC= 6	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	全開で	生食 50mL div. (ブライミング)			
	※60・30min	生食 250mL + テセントリク 1200mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
	※90・60・30min	生食 100mL + アバスチン _____ mg div.			
	30min	生食 100mL + ハ'ロ/セトロン 0.75mg + ファモチ'ン 20mg + テ'キサ'ト 6.6mg + ホ'ララ'シ 10mg div.			
	3hr	生食 500mL + パクリタキセル _____ mg div.			
1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン _____ mg div. (遮光保存)				
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

※ テセントリクの投与時間は初回投与は 60 分間かけて点滴静注して下さい。初回投与時の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与は 30 分間まで短縮できます。

※ アバスチンの投与時間は初回投与は 90 分間かけて点滴静注して下さい。初回投与時の忍容性が良好であれば、2 回目の投与は 60 分間に行うことができ、さらに 2 回目投与時の忍容性も良好であれば、それ以降の投与は 30 分間に行うことができます。

(注) パクリタキセルを投与する場合、可塑剤 (DEHP) を含まない PVC フリーの点滴セットを用い、0.22 ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与して下さい。

※新規患者またはレジメン変更（抗がん剤の変更・追加）の患者に対して同意書を記載して下さい。