

がん薬物療法計画指示書（大腸癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 XELOX + Pmab 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 年 月 日 ~ 年 月 日
 ・実施クール () クール目

2. 患者情報 診断名 (治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①ベクティビックス点滴静注 100mg	9mg/kg	mg	d. i. v.	生食 100mL
②オキサリプラチン点滴静注液 (50mg : 100mg)	130mg/m ²	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL
③ゼローダ錠 300mg	下記参照	1日 _____ mg	p. o.	

4. 投与レジメン

Day 1 夕食後 ~ Day 15 朝食後	ゼローダ錠 300 1回 _____ mg 1日2回14日間 (内服終了後 7日間休薬)	ゼローダ投与量 (C法)	
		体表面積	ゼローダ1回用量
Day1 夕食後 (/) 内服開始~Day15 朝食後 (/) 内服終了			
		1. 36m ² 未満	1回 1200mg (4錠) 1日2回
		1. 36m ² 以上 ~ 1. 66m ² 未満	1回 1500mg (5錠) 1日2回
		1. 66m ² 以上 ~ 1. 96m ² 未満	1回 1800mg (6錠) 1日2回
		1. 96m ² 以上	1回 2100mg (7錠) 1日2回

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	30min	グラネセロン点滴静注液 3mg ハック' + デキサート 6. 6mg div.			
	1hr	生食 100mL + ベクティビックス _____ mg div.			
	2hr	5%ブドウ糖 250mL + オキサリプラチン _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					