

## がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 AMR 単剤療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日  
 ・実施クール ( ) クール目

2. 患者情報 診断名 ( 非小細胞肺がん ・ 小細胞肺がん )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## 3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①カルセド注射用 (20mg : 50mg)	40mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 50mL

## 4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day1 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg div.			
	60min	5% ブドウ糖 250mL div. ※ 5%ブドウ糖を点滴中に側管より全開で投与 生食 50mL + カルセド _____ mg div.			
Day2 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg div.			
	60min	5% ブドウ糖 250mL div. ※ 5%ブドウ糖を点滴中に側管より全開で投与 生食 50mL + カルセド _____ mg div.			
Day3 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg div.			
	60min	5% ブドウ糖 250mL div. ※ 5%ブドウ糖を点滴中に側管より全開で投与 生食 50mL + カルセド _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					