

## がん薬物療法計画指示書（肺癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 CBDCA + Tri-weekly PTX 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目

2. 患者情報 診断名 ( 進行・再発非小細胞肺癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

年齢 \_\_\_\_\_ 歳 sCr \_\_\_\_\_ mg/dL GFR \_\_\_\_\_

※ アルコール過敏症の患者は慎重投与

3. 使用薬剤・投与量

CBDCA 投与量 ( ) mg/body = AUC × (GFR+25) ; GFR =  $\frac{(140 - \text{Age}) \times \text{体重}}{\text{sCr}(\text{mg/dL}) \times 72}$ 

女性の場合は体重に 0.85 を掛ける

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①パクリタキセル注射液 (30mg : 100mg)	200mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 500mL
②カルボプラチン点滴静注液 (50mg : 150mg : 450mg)	AUC= 6	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	30min	生食 250mL + プロイメンド点滴静注用 150mg div.			
	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg + ファモチジン 20mg + ポララミン注 10mg div.			
	3hr	生食 500mL + パクリタキセル _____ mg div.			
	1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン _____ mg div. (遮光保存)			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					

## 注意

パクリタキセルを投与する場合、可塑剤 (DEHP) を含まない PVC フリーの点滴セットを用い、0.22 ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与して下さい。