

## がん薬物療法計画指示書（肺癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

レジメン名称 CBDCA + Weekly PTX 療法

【1クールの日数 28日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

・実施クール（ ）クール目

2. 患者情報 診断名（進行・再発非小細胞肺癌）

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

年齢 \_\_\_\_\_ 歳 sCr \_\_\_\_\_ mg/dL GFR \_\_\_\_\_

※アルコール過敏症の患者は慎重投与

3. 使用薬剤・投与量

CBDCA 投与量（ ）mg/body = AUC × (GFR+25) ; GFR =  $\frac{(140 - \text{Age}) \times \text{体重}}{\text{sCr}(\text{mg/dL}) \times 72}$ 

女性の場合は体重に 0.85 を掛ける

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①パ'クリタキセル注射液 (30mg : 100mg)	80 mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 250mL
②カルボ'プラチン点滴静注液 (50mg : 150mg : 450mg)	AUC= 6	mg	d. i. v.	5%ブ'ドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 13.2mg + ファモチジン 20mg + ポララミン注 10mg div.			
	1hr	生食 250mL + パクリタキセル _____ mg div.			
	1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン _____ mg div. (遮光保存)			
Day 8 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg + ファモチジン 20mg + ポララミン注 10mg div.			
	1hr	生食 250mL + パクリタキセル _____ mg div.			
Day 15 ( / )	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6.6mg + ファモチジン 20mg + ポララミン注 10mg div.			
	1hr	生食 250mL + パクリタキセル _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の（前日・当日朝）					

## 注意

パクリタキセルを投与する場合、可塑剤 (DEHP) を含まない PVC フリーの点滴セットを用い、0.22 ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与して下さい。