北海道中央労災病院

がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医）　＿＿＿＿＿＿

指示日　　年　　月　　日

レジメン名称　CBDCA + Weekly nab-PTX + BV 療法

【1 クールの日数　21 日】

1. 治療予定期間　　年　　月　　日 ～　　年　　月　　日

・実施クール　（　　）クール目 / 3～6 クール

なお、ベバシズマブ併用療法終了後、ベバシズマブ単剤投与を継続して下さい。

2. 適応　（扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌）

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量(mg)	投与方法	輸液
①アブラキサン 100mg	100mg/m^2	mg	d.i.v.	生理食塩液＿＿＿mL
②カルボプラチン(50mg：150mg：450mg)	AUC= 6	mg	d.i.v.	5%ブドウ糖 250mL
③ベバシズマブ(100mg：400mg)	15mg/kg	mg	d.i.v.	生理食塩液 100mL

※ 生理食塩液の投与量（ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解後）＝ $\frac{\text{ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ投与量 (mg)}}{5\text{mg/mL}}$

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤
Day 1	全開で	生理食塩液 50mL　div.（プライミング）
	30min	生理食塩液 ※＿＿＿mL + アブラキサン＿＿＿mg　div.
	全開で	生理食塩液 50mL　div.（フラッシュ）
	30min	生理食塩液 100mL + ﾊﾞﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg + ﾃﾞｷｻｰﾄ 6.6mg　div.
	1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン＿＿＿mg　div.(遮光保存)
	※90・60・30min	生理食塩液 100mL + ベバシズマブ＿＿＿mg　div.
Day 8	15min	生理食塩液 50mL + ﾃﾞｷｻｰﾄ 6.6mg　div.
	30min	生理食塩液 ※＿＿＿mL + アブラキサン＿＿＿mg　div.
	全開で	生理食塩液 50mL　div.（フラッシュ）
Day 15	15min	生理食塩液 50mL + ﾃﾞｷｻｰﾄ 6.6mg　div.
	30min	生理食塩液 ※＿＿＿mL + アブラキサン＿＿＿mg　div.
	全開で	生理食塩液 50mL　div.（フラッシュ）

※ ただし、ベバシズマブの投与時間は初回投与は 90 分間かけて点滴静注して下さい。初回投与時の忍容性が良好であれば、2 回目の投与は 60 分間にすることができ、さらに 2 回目投与時の忍容性も良好であれば、それ以降の投与は 30 分間にすることができます。

※ アブラキサンを投与する場合、インラインフィルターは使用しないで下さい。