

## がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 CDDP + VNR 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 年 月 日 ~ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目 / 4クール

2. 患者情報 診断名 ( 進行・再発非小細胞肺癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Ccr \_\_\_\_\_ mL/min T-Bil \_\_\_\_\_ mg/dL

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①ロセ'ウス (10mg : 40mg)	25mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 50mL
②シス'ラチン (10mg : 25mg : 50mg)	80mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 500mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.			
	15min	生食 50mL + パロノセトロン 0.75mg + テ'キサト 9.9mg div.			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL + 硫酸マ'ネシウム補正液 8mL div. ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
	1hr	生食 500mL + シス'ラチン _____ mg div. (遮光保存) (全量 500mL に調製する)			
	全開で	生食 50mL + フロセミド注 20mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL div.			
Day 8 ( / )	全開で	生理食塩液 50mL div. (プライミング)			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	全開で	生理食塩液 50mL div. (フラッシュ) ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					

※ 血管外漏出の場合、冷やすと逆に組織障害が増すという報告もあり、例外としてロセ'ウスの場合、温めたほうが血管を広げ薬剤の吸収を早めるため良いとされています。

◎ 内服処方 (制吐剤); Day 2 ( / ) ~ Day 4 ( / )

Rp. 1) デカドロン錠 (0.5mg) 16錠 / 2× 朝食後、夕食後 3日分

5. 投与時の注意点 (適応患者)

(ア) 腎機能・心機能が十分に維持されていること。また全身状態が良好であること。(PS 0~1)

(イ) 当日シス'ラチン投与が終了するまでに、1L程度の飲水を心掛けるよう患者に促す。また翌日以降も腎障害を予防するため十分な飲水 (通常の飲水に加え 1L程度の飲水) を摂るよう指導する。(約 3~5日間)

※新規患者またはレジメン変更 (抗がん剤の変更・追加) の患者に対して同意書を記載して下さい。