

がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 VNR 単剤療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 _____ 年 月 日 ~ _____ 年 月 日

・実施クール () クール目

2. 患者情報 診断名 (進行・再発非小細胞肺癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²
T-Bil _____ mg/dL

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①ロセ'ウス静注液 (10mg : 40mg)	25mg/m ²	mg	div.	生食 50mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day1 (/)	全開で	生食 50mL div. (プライミング)			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
Day8 (/)	全開で	生食 50mL div. (プライミング)			
	全開で	生食 50mL + ロセ'ウス _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. ※ロセ'ウス投与終了後、直ちに投与する。(静脈炎予防のため)			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

※ 血管外漏出の場合、冷やすと逆に組織障害が増すという報告もあり、例外としてロセ'ウスの場合、**温め**たほうが血管を広げ薬剤の吸収を早めるため良いとされています。