

## がん薬物療法計画指示書（肺癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 キイトルーダ + PEM + CDDP 療法【normal hydration】

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目/ 4クール

2. 患者情報 診断名 ( 非扁平上皮非小細胞肺癌 )

尚、この4クール併用療法終了後、キイトルーダ+PEM 療法を継続して下さい。

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Ccr \_\_\_\_\_ mL/min

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①キイトルーダ 100mg	200mg/body	200mg (固定用量)	d. i. v.	生食 100mL
②ペメトレキセド (100mg : 500mg)	500 mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 100mL
③シスプラチン (10mg : 50mg)	75 mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 500mL

4. 投与レジメン

・ペメトレキセド投与による重篤な副作用の発現を軽減するため。

シアノコバラミン注射液 i. m.	初回投与7日前 ( / ) 以後9週毎 ( )	パンピタン末 1g 1×	初回投与7日以上前から連日投与 ( / ~)
-------------------	----------------------------	--------------	---------------------------

シアノコバラミン注射液及びパンピタン末はペメトレキセドの投与中止または終了する場合、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day1 ( / )	1hr	生食 500mL div.			
	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.			
	15min	生食 50mL + パロノセトロン 0.75mg + デキサート 9.9mg div.			
	30min	生食 100mL + キイトルーダ 200mg div.			
	10min	生食 100mL + ペメトレキセド _____ mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL + 硫酸マグネシウム補正液 8mL div.			
	2hr	生食 500mL + シスプラチン _____ mg div. (遮光保存) (全量 500mL に調製する)			
	全開で	生食 50mL + フロセミド注 20mg div.			
	1hr	生食 500mL div.			
	3hr	ソルデム 3A 1000mL div.			
Day2・3	30min	生食 100mL + デキサート 6.6mg div.			
	4hr	ソルデム 3A 1500mL div.			
Day4	30min	生食 100mL + デキサート 6.6mg div.			

※インラインフィルター (0.2~5µm) を使用してください。