

がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） _____

指示日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

レジメン名称 キイトルーダ[®] + PTX + CBDCA 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

・実施クール () クール目 / 4クール

尚、この4クール併用療法終了後、キイトルーダ[®]単剤療法を継続して下さい。

2. 患者情報 診断名 (切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²
 年齢 _____ 歳 sCr _____ mg/dL GFR _____

※アルコール過敏症の患者は慎重投与

3. 使用薬剤・投与量

CBDCA 投与量 () mg/body = AUC × (GFR+25) ; $GFR = \frac{(140 - Age) \times \text{体重}}{sCr(mg/dL) \times 72}$

女性の場合は体重に 0.85 を掛ける

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①キイトルーダ点滴静注 (100mg)	200mg/body	200mg (固定用量)	d. i. v.	生食 100mL
②パクリタキセル注射液 (30mg : 100mg)	200 mg/m ²	mg	d. i. v.	生食 500mL
③カルボプラチン点滴静注液 (50mg : 150mg : 450mg)	AUC= 6	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	30min	生食 250mL + プロイメンド点滴静注用 150mg div.			
	30min	グラセロン点滴静注液 3mg ハ'ツ' + ファモチジン 20mg + デキサート 6.6mg + ポララミン注 10mg div.			
	30min	生食 100mL + キイトルーダ 200mg div.			
	3hr	生食 500mL + パクリタキセル _____ mg div.			
	1hr	5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン _____ mg div. (遮光保存)			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

パクリタキセル及びキイトルーダを投与する場合、可塑剤 (DEHP) を含まない PVC フリーの点滴セットを用い、0.22 ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与して下さい。

※新規患者またはレジメン変更 (抗がん剤の変更・追加) の患者に対して同意書を記載して下さい。