

## がん薬物療法計画指示書（肺 癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

レジメン名称 **テセントリク単剤療法**

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
・実施クール ( ) クール目

2. 患者情報 診断名 ( 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg

## 3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①テセントリク点滴静注 (1200mg)	1200mg/body	1200mg (固定用量)	d. i. v.	生食 250mL

## 4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	全開で	生食 50mL div. (プライミング)			
	※60・30min	生食 250mL + テセントリク 1200mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					

※インラインフィルター (0.2 又は 0.22  $\mu$ m) を使用してください。

ただし、テセントリクの投与時間は初回投与は 60 分間かけて点滴静注して下さい。初回投与時の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与は 30 分間まで短縮できます。