

## がん薬物療法計画指示書（乳 癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 FEC 100 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目 / 4 クール

2. 患者情報 診断名 ( 再発・転移乳癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 Ccr \_\_\_\_\_ mL/min T-Bil \_\_\_\_\_ mg/mL

## 3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
① ㊦'㊦'シ (10mg : 50mg)	100mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 100mL
② 注射用エンドキサン (100mg : 500mg)	500mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 250mL
③ フルオロウラシル (250mg : 1000mg)	500mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	生食 50mL

ただし、㊦'㊦'シの総投与量は 900mg/m<sup>2</sup> 以下とする。

## 4. 投与レジメン

◎内服処方（制吐剤） ; Day 2 ( / ) ~ Day 4 ( / )

Rp. 1) デカドロン錠 (0.5mg) 16 錠 / 2× 朝食後、夕食後 3 日分

## 5. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.			
	30min	生食 100mL + ハ'ロ/セトロン 0.75mg + テ'キ'サ'ト 9.9mg div.			
	15min	生食 100mL + ㊦'㊦'シ _____ mg div.			
	30min	生食 250mL + 注射用エンドキサン _____ mg div.			
	15min	生食 50mL + フルオロウラシル _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )					

※ ㊦'㊦'シは起壊死性抗がん剤のため血管外漏出には注意すること。

※ ㊦'㊦'シは総投与量が 900mg/m<sup>2</sup> を超えると、心毒性のリスク増大の可能性あり。

※ ㊦'㊦'シ：肝機能障害のある場合には投与量の減量や中止を考慮する。また尿が赤くなることがある。