

がん薬物療法計画指示書（胃癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 CDDP + S-1 療法

【1クールの日数 35日】

1. 治療予定期間 _____ 年 月 日 ~ _____ 年 月 日

・実施クール () クール目

(S-1 は 3 週間投与し 2 週間休薬・CDDP は Day 8 に投与)

2. 患者情報 診断名 (進行・再発胃癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m² Ccr _____ mL/min

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①エスワン (20mg : 25mg)	下記参照	1日 _____ mg	p. o.	
②シスプラチン (10mg : 25mg : 50mg)	60mg/m ²	_____ mg	d. i. v.	生食 500mL

4. 投与レジメン

Day 1 ~ Day 21	エスワン 1回 _____ mg 1日 2回 21日間	エスワン投与量	
		体表面積	初回基準 (カ'フル相当量)
		Day 1 (/) 朝食後または夕食後から 21 日間内服する。	
		1. 25m ² 未満	1回 40mg 1日 2回
		1. 25m ² 以上 ~ 1. 5m ² 未満	1回 50mg 1日 2回
		1. 5m ² 以上	1回 60mg 1日 2回

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 8 (/)	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.			
	15min	生食 50mL + ハ'ロ/セトロン 0. 75mg + テ'キサート 9. 9mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL + 硫酸マグ'ネシウム補正液 8mL			
	1hr	生食 500mL + シスプラチン _____ mg div. (遮光保存) (全量 500mL に調製する)			
	全開で	生食 50mL + フロセミド 20mg div.			
	1hr	ソルデム 3A 500mL div.			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

◎ 内服処方 (制吐剤): Day 9 (/) ~ Day 11 (/)

Rp. 1) デカドロン錠 (0. 5mg) 16 錠 / 2× 朝食後、夕食後 3日分

5. 投与時の注意点 (適応患者)

- 腎機能・心機能が十分に維持されていること。また全身状態が良好であること。(PS 0~1)
- 当日シスプラチン投与が終了するまでに、1L 程度の飲水を心掛けるよう患者に促す。また翌日以降も腎障害を予防するため十分な飲水 (通常の飲食に加え 1L 程度の飲水) を摂るよう指導する。(約 3~5 日間)