

がん薬物療法計画指示書（胃癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 DTX + S-1 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 (年 月 日 ~ 年 月 日)
 ・実施クール () クール目・S-1 は2週間投与し1週間休薬

2. 患者情報 診断名 (進行・再発胃癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
① エスワン (20mg : 25mg)	下記参照	1日 _____ mg	p. o.	
② ドセタキセル点滴静注 (20mg : 80mg)	40mg/m ²	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

※ドセタキセル点滴静注はアルコールフリーです。

4. 投与レジメン

Day 1 ~ Day 14	エスワン 1回 _____ mg 1日2回 14日間	エスワン投与量	
		体表面積	初回基準 (テカ'フル相当量)
Day1 (/) 朝食後または夕食後から14日間内服する。			
		1. 25m ² 未満	1回 40mg 1日2回
		1. 25m ² 以上 ~ 1. 5m ² 未満	1回 50mg 1日2回
		1. 5m ² 以上	1回 60mg 1日2回

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6. 6mg div.			
	60min	5%ブドウ糖 250mL + ドセタキセル _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

5. 処方

吐き気時

投与翌日以降：グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 3. 3mg (1. 65mg×2A) d. i. v.