

がん薬物療法計画指示書（胃 癌）

主治医（指示医） _____

指示日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

レジメン名称 SOX 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

・実施クール () クール目
(S-1 は 2 週間投与し 1 週間休薬)

2. 患者情報 診断名 (胃 癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
① エスワン (20mg : 25mg)	下記参照	1 日 _____ mg	p. o.	
② オキサリプラチン点滴静注液 (50mg : 100mg)	100mg/m ²	_____ mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL

4. 投与レジメン

Day 1 ~ Day14	エスワン 1 回 _____ mg 1 日 2 回 14 日間	エスワン投与量	
		体表面積	初回基準 (テカフル相当量)
Day1 (/) 朝食後または夕食後から 14 日間内服する。		1. 25m ² 未満	1 回 40mg 1 日 2 回
		1. 25m ² 以上 ~ 1. 5m ² 未満	1 回 50mg 1 日 2 回
		1. 5m ² 以上	1 回 60mg 1 日 2 回

投与日	投与時間	薬剤	指示受け 確認	実施	Dr. 確認
Day 1 (/)	30min	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ + デキサート 6. 6mg div.			
	2hr	5%ブドウ糖 250mL + オキサリプラチン _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					