

## がん薬物療法計画指示書（膵臓癌）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 FOLFIRINOX 療法

【1クールの日数 14日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日

・実施クール ( ) クール目

2. 患者情報 診断名 ( 治癒切除不能な膵臓癌 )

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## 3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①オキサリプラチン (50mg : 100mg)	85mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL
②イリリテカン (40mg : 100mg)	180mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL
③レボホリナート (25mg : 100mg)	200mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 250mL
④フルオウラシル (250mg : 1000mg)	400mg/m <sup>2</sup>	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 50mL
⑤フルオウラシル (250mg : 1000mg)	2400mg/m <sup>2</sup>	mg	cont. d. i. v.	生食 _____ mL

## 4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認	
Day 1 ( / )	30min	生食 250mL + プロイメンド 150mg div.				
	30min	生食 100mL + ハロノセロン 0.75mg + テキサート 9.9mg div.				
	2hr	5%ブドウ糖 250mL + オキサリプラチン _____ mg div.				
	2hr	} 並列 div.	5%ブドウ糖 250mL + イリリテカン _____ mg			
			5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート _____ mg			
全開で	5%ブドウ糖 50mL + フルオウラシル _____ mg div.					
※入院で実施する場合	輸液ポンプ使用 3mL/hr で 46hr	フルオウラシル _____ mg ( _____ mL) + 生食 _____ mL 合計 138mL ※全量 138mL に調製します。				
※外来で実施する場合	インフューザー ポンプ使用 2.5mL/hr で 46hr	フルオウラシル _____ mg ( _____ mL) + 生食 _____ mL 合計 _____ mL				
CBC・生化学検査は投与日の ( 前日・当日朝 )						

※ 入院時または外来時でフルオウラシル注を 46 時間持続静注する場合、上記のレジメンに従ってどちらかを選び入力して下さい。(不要な Rp. は削除して下さい)