

がん薬物療法計画書（胸腺癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

プロトコール名称 ADOC 療法

【1クールの日数 21日】

1. 治療予定期間 _____ 年 月 日 ~ _____ 年 月 日

・実施クール（ ）クール目

2. 適応（胸腺腫）

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①ドキシソルピシン (10mg : 50mg)	40 mg/m ²	mg	d. i. v.	生理食塩液 100mL
②シスプラチン (10mg : 50mg)	50 mg/m ²	mg	d. i. v.	生理食塩液 500mL
③オンコビン 1mg	0.6 mg/m ²	mg	d. i. v.	生理食塩液 50mL
④注射用エンドキサン 500mg	700 mg/m ²	mg	d. i. v.	生理食塩液 250mL

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤
Day1	1hr	生理食塩液 500mL div.
	30min	生理食塩液 250mL + プロイメンド 150mg div.
	15min	生理食塩液 50mL + パロノセトロン 0.75mg + デキサート 9.9mg div.
	30min	生理食塩液 100mL + ドキシソルピシン _____ mg div.
	1hr	ソルデム 3A 500mL + 硫酸マグネシウム補正液 8mL div.
	2hr	生理食塩液 500mL + シスプラチン _____ mg div. (遮光保存) 【全量 500mL に調製】
	全開で	生理食塩液 50mL + フロセミド注 20mg div.
	1hr	生理食塩液 500mL div.
Day2	3hr	ソルデム 3A 1000mL div.
	30min	生理食塩液 100mL + デキサート 6.6mg div.
Day3	4hr	ソルデム 3A 1500mL div.
	30min	生理食塩液 100mL + デキサート 6.6mg div.
	5min	生理食塩液 50mL + オンコビン _____ mg div. 【1mg を超えないこと】
Day4	4hr	ソルデム 3A 1500mL div.
	30min	グラニセトロン 3mg バッグ + デキサート 6.6mg div.
	1hr	生理食塩液 250mL + 注射用エンドキサン _____ mg div.
	3hr	ソルデム 3A 1000mL div.

5. 投与時の観察項目および注意点

- ※ ドキシソルピシンおよびオンコビンは血管外漏出に特に注意。
- ※ ドキシソルピシン：心機能異常またはその既往歴のある患者には禁忌。総投与量 500mg/m² までとする。
- ※ ドキシソルピシン：肝機能障害のある場合には投与量の減量や中止を考慮する。また尿が赤くなることがある。
- ※ オンコビン：便秘、難聴、蓄積性神経毒性に注意。また1回量 1mg を超えないこと。
- ※ エンドキサン：出血性膀胱炎予防として十分な水分摂取と頻尿な排尿を心がける。